

AVANT ET APRÈS : L'HISTOIRE DE FRANKLIN PADILLA

Nom : Franklin
Race : Pinscher nain
Âge : 7 ans
Propriétaire : Christina Padilla
Vétérinaire : David Duclos, DMV, prof. agrégé, ACVD
Clinique : Animal Skin & Allergy Clinic, Lynnwood (Washington)

AVANT ATOPICA (cyclosporine A)

Symptômes : Franklin souffrait depuis 3 ans de démangeaisons sur la face, le cou et le thorax, sous les pattes, sur la région abdominale et sur les extrémités proximales.

Traitements précédents : Franklin avait reçu des glucocorticoïdes et des antibiotiques et était baigné avec des shampoings spéciaux.

APRÈS ATOPICA

Le Dr Duclos a prescrit ATOPICA à raison d'une dose par jour pendant 30 jours. Une amélioration considérable a été notée au cours des 4 premières semaines de traitement. Le prurit a diminué et les lésions cutanées ont commencé à guérir.

Comme c'est le cas pour tous les médicaments, des effets indésirables peuvent survenir. Dans le cadre d'une étude menée sur le terrain, les effets indésirables les plus fréquemment observés ont été les troubles gastro-intestinaux. Une hyperplasie gingivale et des papillomes peuvent également survenir durant la phase initiale du traitement. ATOPICA ne doit pas être utilisé chez les chiens qui présentent des antécédents de néoplasie maligne. Consultez le feuillet d'information du produit pour connaître les directives thérapeutiques.



 **NOVARTIS**

© Novartis Animal Health US, Inc., 2005.
ATOPICAMC est une marque de commerce
de Novartis AG,
Novartis Santé Animale Canada Inc., usager licencié.

**Atopica**^{MC}
(cyclosporine A)